



**Implantando
confianza.**



4

Implantando confianza.

Confianza en uno mismo

Transfórmese en su mejor versión gracias a sus nuevos implantes. Deje que su nueva sonrisa le ilumine el rostro.

Confianza en la vida

Redescubra la alegría de esos momentos especiales con amigos o familiares. Saboree una buena comida y la compañía de sus seres queridos con confianza.

Confianza en sus decisiones

Cuíde de usted y de su salud bucodental. Elija implantes dentales. Decir sí a los implantes es decir sí al futuro de su salud.

Confianza en el futuro

Con su nueva sonrisa llega una nueva libertad. Afronte nuevos retos y mire al mañana con confianza.

Consulte con su dentista acerca de sus implantes dentales. Son profesionales especialmente formados en implantes dentales y le proporcionarán el mejor implante y prótesis para sus necesidades.



Más que un simple implante.

Sus necesidades son únicas. Su dentista le sugerirá un tratamiento con implantes funcional, estético y adaptado a su situación. Este tratamiento con implantes puede utilizarse para reemplazar un solo diente, varios dientes o incluso toda su sonrisa.

Los implantes mejoran su salud bucodental.

No solo reemplazan los dientes perdidos, sino que también preservan la estructura ósea existente.

Esto se debe a que la pérdida de un diente gradualmente provoca que el hueso alrededor del mismo se descomponga (lo que también se conoce como resorción ósea).

La resorción ósea a menudo causa que los dientes vecinos se muevan o puede comprometer la estabilidad de la dentadura.

Un implante dental estimula la estructura ósea. Esto previene la pérdida ósea y preserva los dientes adyacentes naturales.

Reduzca al mínimo la duración del tratamiento.

Su dentista puede sugerir una solución basada en su situación que reduzca al mínimo el tiempo de tratamiento.


Recibirá la misma calidad asistencial, pero con menos visitas al dentista y mayor comodidad.

Una solución duradera.

Con una buena higiene bucal y el cuidado adecuado, los implantes dentales pueden durar toda la vida.

Preserve las estructuras anatómicas de su boca.

Los implantes tienen una forma especial y están hechos de un material altamente resistente. Permiten tratamientos que preservan su hueso natural existente y limitan la cantidad de cirugía requerida.




¿Qué es un implante dental?

Un implante dental es una raíz artificial. Reemplaza la raíz del diente natural que ha perdido. El implante actúa como base. Luego encima se coloca una prótesis, como una corona, un puente o un accesorio para dentaduras. El procedimiento quirúrgico para colocar un implante es totalmente seguro, con una tasa de éxito superior al 95 %.

Su cirujano oral le sugerirá un tratamiento adaptado a su situación.


1 Reemplazo de un solo diente

El diente perdido es reemplazado con una prótesis encima de un implante. Esto preserva los dientes circundantes. También mantiene su hueso existente y su sonrisa.




2 Reemplazo de varios dientes

Se pueden utilizar dos o más implantes para reemplazar las raíces perdidas. Estos implantes forman la base de una prótesis fija (no extraíble). Esta prótesis, o “puente”, reemplaza sus dientes. Aquí también los implantes preservan la estructura ósea, así como los dientes adyacentes.




3 Reemplazo de todos los dientes

Una sobredentadura fija completa puede descansar sobre 4-6 implantes, algunas veces más, dependiendo de su situación. La sobredentadura reemplaza todos los dientes de la parte superior o inferior de la boca, y la sensación y el aspecto serán similares a los dientes naturales. ¡Por fin, no más molestias!



4 ¿Usa dentadura?

Los implantes también pueden proporcionar una mejor estabilidad para las dentaduras extraíbles. Además hay “mini” implantes de modo que incluso los pacientes con pérdida ósea extensa pueden beneficiarse de este tratamiento. Cuanto más estable sea su dentadura, mayor será su comodidad y mejor su calidad de vida.



Siéntase con confianza en cada fase del tratamiento.

1. Diagnóstico

Como cada paciente es único, determinar sus necesidades y deseos exactos es vital. A partir de una consulta y de imágenes médicas, su cirujano oral decidirá el tipo de tratamiento que necesita. De las diferentes opciones que sugiera el cirujano, puede elegir la que mejor se adapte a usted.

2. Cirugía, colocación del implante

Primero se le administrará anestesia local. Luego el cirujano oral colocará el implante en el hueso donde falte el diente. Entonces el cirujano puede colocar una prótesis provisional sobre el implante, pero esto dependerá de su situación.

3. Cicatrización

Durante esta fase, el hueso se integra y cicatriza alrededor del implante. Esta fase es vital para el éxito de su tratamiento, y se conoce como "osteointegración". Su cirujano oral le dirá cuánto tiempo tardará esta fase de cicatrización antes de que se le pueda colocar la prótesis final.

4. Restauración de su sonrisa

Su nuevo diente está ahora colocado en el implante cicatrizado. Su cirujano oral tomará una impresión y la enviará a un técnico dental, quien se encargará de fabricar una prótesis que coincida exactamente con su situación y el resultado estético deseado.

5. Seguimiento

Para asegurarse de que su nueva prótesis e implante duren mucho tiempo, tendrá que regresar a la consulta para hacerse revisiones una o dos veces al año. Durante estas revisiones, se comprobarán y limpiarán las encías y los tejidos alrededor de los dientes, y es posible que se tomen radiografías.



Tiene preguntas. Tenemos respuestas.

¿Los implantes dentales son una técnica fiable?

La técnica de implantes dentales llevan más de 40 años cumpliendo las expectativas de los pacientes. Hoy en día, es reconocido como el tratamiento estándar para reemplazar los dientes perdidos. Los dientes artificiales fijos colocados encima de implantes restauran la funcionalidad y la estética oral.

¿Soy candidato para los implantes dentales?

Los casos en que los pacientes no son candidatos para recibir implantes son muy poco frecuentes. Si goza de buena salud o tiene alguna patología subyacente pero que está bajo control, puede ser perfectamente candidato para los implantes dentales. Su cirujano oral confirmará si está en condiciones de recibir el tratamiento.

¿Cuánto tiempo tarda el tratamiento con implantes?

El tratamiento puede llevar entre 3 y 12 meses, dependiendo de su situación. Su cirujano oral, podrá, si el caso lo permite, colocar una prótesis provisional o definitiva sobre su implante para que su aspecto y sus sensaciones sean los mejores posibles. A continuación, juntos decidirán un calendario de tratamiento.

¿La colocación del implante será dolorosa?

La colocación del implante es un procedimiento quirúrgico. Como tal, se realiza bajo anestesia local. También se requiere una medicación previa especial para minimizar las molestias después del procedimiento.

¿Cuándo recibiré mi prótesis definitiva?

La prótesis definitiva se coloca después de que el hueso haya cicatrizado alrededor del implante. Durante el período de cicatrización, se puede colocar una prótesis temporal, generalmente fija.

¿Me pondrán los dientes nuevos al mismo tiempo que el implante?


En algunas situaciones, la “carga inmediata” puede ser factible. Si es así, se colocarán un implante y una prótesis fija provisional justo después de la extracción del diente.

¿Será como si tuviera dientes naturales?

Ese es el objetivo. El implante es la base. La prótesis colocada sobre el implante tendrá la misma forma y color que sus dientes naturales. Con esta prótesis fija las sensaciones serán muy similares a las de los dientes naturales.

¿Cuánto tiempo durarán mis implantes?

Estudios recientes demuestran que de los implantes colocados hace 10 años, el 90 % todavía son funcionales hoy en día. Sus implantes durarán más tiempo si sigue las técnicas de cepillado que le haya explicado su cirujano oral y si cumple la pauta de revisiones recomendada.



Cada procedimiento quirúrgico conlleva riesgos potenciales. Consulte siempre a un profesional de la odontología antes del tratamiento. Los factores de riesgo potenciales pueden variar dependiendo de la salud de cada paciente.

