

CUIDADOS PÓS-CIRÚRGICOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS

ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO APÓS INSTALAÇÃO DO IMPLANTE DENTÁRIO POR 48H

- > Faça repouso relativo e mantenha a cabeça mais elevada. Ao dormir, evite deitar-se sobre o lado operado.
- > Evite exposição solar e ao calor.
- > Evite esforço físico.
- > Próteses e aparelhos devem ser usados conforme orientações profissionais.
- > Evite fumar, consumir bebidas alcoólicas, cuspir e beber usando canudos.
- > Evite se alimentar enquanto estiver anestesiado. Priorize alimentos líquidos, macios ou pastosos, de temperatura ambiente ou fria.
- > A escovação deve ser suave com escova de cerdas macias e não passe sob a região operada.
Higienize a região com a solução antisséptica indicada, 2 vezes ao dia, sem diluir em água. Evite bochechar.
Faça compressa com gelo/gel extraoral. Use um pano umedecido entre gelo/gel e a pele. Mantenha a compressa por 10 minutos, respeitando o período de descanso.
Tome as medicações conforme orientado pelo dentista.
- >

O QUE NÃO FAZER APÓS A CIRURGIA DE IMPLANTE DENTÁRIO IMEDIATO PRIMEIRAS 48H

- > Bochechos.
- > Escovar sobre o implante dentário ou a gengiva.
- > Remover a sutura.

O QUE FAZER APÓS UMA SEMANA DE CIRURGIA

- > Retornar para a consulta de manutenção e pós-cirúrgica com o dentista.
Escovar com leveza a região operada.
- > Alimentação normalizada.
- > Realizar bochechos com solução indicada pelo profissional.
Atividade física liberada.
- > Remoção de sutura com o dentista.
- >